

Tràng An, ngày 06 tháng 4 năm 2025

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU

Hiện nay bệnh Thủy đậu bắt đầu xuất hiện và ngày càng tăng nhanh tại các khu vực dân cư đông đúc như nhà trẻ, mẫu giáo, trường học.

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh và có thêm kiến thức hiểu rõ, nhận thức rõ bệnh Thủy đậu là gì, biểu hiện của bệnh ra sao, cách điều trị và phòng tránh như thế nào... thì Trường Mầm Non Tràng An tuyên truyền tới CBGVNV và phụ huynh có thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh căn bệnh này.

Bệnh thủy đậu là gì:

Bệnh thủy đậu là bệnh nhiễm virus cấp tính, với triệu chứng sốt nhẹ, phát ban. Ban mọc nhiều đợt trên cùng một vùng da nên có thể thấy chúng ở nhiều lứa tuổi khác nhau từ nốt sần, bọng nước trong, bọng nước đục đến nốt vảy.

PHÒNG BỆNH THỦY ĐẬU BẰNG CÁCH NÀO?

Lưu ý: Phu nữ có kế hoạch sinh con cần tiêm 2 mũi thủy đậu trước khi có thai ít nhất 3 tháng.

• Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Lịch tiêm:

- Từ 12 tháng tuổi đến 12 tuổi: Tiêm 1 mũi càng sớm càng tốt.
- Từ 13 tuổi trở lên: Tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 8 tuần.

Mọi người đặc biệt là phu nữ có thai cần hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh và nghỉ ngơi远离病人。

Khi tiếp xúc với người bệnh cần做到:

- Khẩu trang, găng tay.
- Sử dụng khăn giấy, nước sạch, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người bệnh hoặc đồ dùng của người bệnh.

Che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khăn bay khỉ

Vệ sinh mũi họng bằng nước mũi sinh lý.

Không dùng riêng các đồ dùng sinh hoạt: khăn mặt, cốc, bát, chén, muỗng...

Không trêu đùa, đồ dùng của trẻ; vệ sinh nhà cửa, trường học bằng dung dịch sát khuẩn thông thường.

Tránh tập trung nơi đông người trong khi đang có dịch thủy đậu.

BỆNH THỦY ĐẬU LÀ GÌ?

- Bệnh thủy đậu (còn gọi là phỏng rạ hay trái rạ) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên.
- Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em là đối tượng dễ mắc nhất.
- Đây là bệnh lành tính nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Phụ nữ có thai mắc bệnh có thể gây sảy thai hoặc để lại di tật cho thai nhi.
- Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh thủy đậu hiệu quả nhất.

NGƯỜI MẮC BỆNH THỦY ĐẬU CÓ NHỮNG BIỂU HIỆN GÌ?

- Sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu.
- Các nốt do xuất hiện rải rác trên da, gây ngứa, đến triền nhanh thành bọng nước.
- Nếu bị nhiễm trùng bọng nước sẽ to, có mủ, lâu hồi và có thể tạo thành sẹo.

BỆNH THỦY ĐẬU LÀM TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

- Lây qua đường hô hấp do hít phải những giọt nước bọt, nước mũi của người bệnh bắn ra và nói chuyện, ho, hắt hơi, chảy nước mũi...
- Lây qua tiếp xúc với đồ vật, dụng cụ (khăn, cốc, bát, tay vin cầu thang...) bị nhiễm vi rút hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với bọng nước bị vỡ.
- Lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai và trong khi đẻ.

CĂN LÀM GI KHI TRẺ MẮC BỆNH THỦY ĐẬU?

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
- Điều thuốc cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ y tế.
- Cách ly trẻ trong phòng riêng, thoáng mát, sạch sẽ, có ánh nắng mặt trời.
- Vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối loãng hoặc dung dịch sát khuẩn.

GÌO VỆ SINH DA ĐỂ PHÒNG NHẤM TRUNG TẨM:

- Tắm rửa cho trẻ bằng nước ấm và xà phòng, thay quần áo cho trẻ hàng ngày, không chà xát mạnh lên da khi tắm làm vỡ mụn nước.
- Không để trẻ vui đùa với nhau, thumm mồ hôi.
- Ám thực ăn mềm, lỏng, dễ tiêu hóa, đủ chất.
- Cho trẻ uống nhiều nước đặc biệt là nước hoa quả.
- Không nên kiêng nước, kiêng gió; không đắp các loại lá cây lên nốt mụn.

2. Tác nhân gây bệnh:

Virus thủy đậu là tác nhân gây bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh zona ở người lớn nên có tên là virus thủy đậu – zona. Virus sống được vài ngày trong vảy thủy đậu tung vào không khí. Virus rất dễ chết bởi các thuốc sát khuẩn thường dùng.

I. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH?

- Thùy đậu là bệnh gây ra do virus varicella Zoster, bệnh rất dễ lây cho những người không có miễn dịch với nó.
- Bệnh lây do tiếp xúc trực tiếp với phát ban hoặc qua những bụi nước có chứa virut gây bệnh khi người bệnh ho hoặc hắt hơi.
- Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất ở trẻ em. Bệnh xảy ra ở người lớn nặng hơn trẻ em.
- Bệnh có thể rải rác hoặc bùng phát thành các vùng dịch lớn nhỏ ở nơi đông dân cư.



3. Đặc điểm dịch tễ:


Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi người có thể mắc bệnh thủy đậu. 90% trẻ dưới 15 tuổi có thể mắc bệnh đặc biệt là độ tuổi học mầm non, tiểu học. Bệnh thường xuất hiện vào mùa đông và mùa đông – xuân.

4. Phương thức lây truyền:

Lây từ người sang người bằng tiếp xúc trực tiếp, lây qua không khí từ các giọt nhỏ dịch tiết đường hô hấp hoặc chất dịch của nốt phỏng hoặc niêm mạc. Bệnh rất dễ lây nhiễm.

- Triệu chứng thường xuất hiện từ 14-16 ngày sau lần tiếp xúc đầu tiên với người bệnh.

- Biểu hiện của bệnh.
 - + Sốt nhẹ từ 1-2 ngày.
 - + Cảm giác mệt mỏi, chán ăn, đau mỏi người và toàn thân phát ban.
 - + Ban thủy đậu thường dưới dạng những chấm đỏ lúc đầu sau đó phát triển thành các mụn nước.
 - + Đầu tiên ban mọc ở đầu, mặt, cổ, thân người và các chi.
 - + Ban thủy đậu thường rất ngứa.



5. Biến chứng của thủy đậu

- Biến chứng của bệnh thủy đậu rất là nhiều, mặc dù đây là một bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những hồng ban mụn nước lan tràn. Tuy nhiên, bệnh có thể có những biến chứng rất quan trọng.

- Biến chứng nhẹ của bệnh là nhiễm trùng da nơi mụn nước, nặng hơn vi trùng có thể xâm nhập từ mụn nước vào máu gây nhiễm trùng huyết. Các biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, viêm tiêu não... là các biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng, hay để lại di chứng sau này.

- Đặc biệt, thậm chí sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh, virus thủy đậu vẫn còn tồn tại trong các hạch thần kinh dưới dạng bất hoạt (ngủ đông).

- Phụ nữ mang thai nếu mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm vì sẽ dễ bị biến chứng nặng, đặc biệt là viêm phổi. Phụ nữ mang thai bị thủy đậu ở 3 tháng đầu của thai kỳ, virus sẽ gây sẩy thai, hay khi sinh ra trẻ sẽ bị thủy đậu bẩm sinh với nhiều dị tật như đầu nhỏ, co gồng tay, chân, trẻ bị bại não, sẹo bẩm sinh...

- Còn nếu trẻ bị trong những ngày mới sinh bệnh sẽ rất nặng với mụn nước nổi rất nhiều và dễ bị biến chứng viêm phổi.

6. Các biện pháp phòng, chống dịch:

a) Chăm sóc

- Cách ly trẻ mắc bệnh tại nhà, không cho trẻ đến trường.
- Chống nhiễm khuẩn, hạ sốt.
- Tại chỗ: Nốt đậu dập vỡ nên chấm dung dịch xanhmethylene; Su bạc.
- Nên cách ly người bệnh 5 đến 7 ngày để tránh lây lan.
- Luôn mặc quần áo thoáng mát, tránh nước và gió cho người bệnh...
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Khử khuẩn toàn bộ bề mặt nhà ở, ngâm các đồ dùng, trò chơi bằng CloraminB, cốc, bát đũa được trùng qua nước sôi và sấy khô trước khi sử dụng.
- Ăn uống đủ chất, uống nhiều nước trong ngày.

- Chú ý cắt ngắn móng tay, giữ sạch tay.
- Tắm rửa bằng các dung dịch sát khuẩn.
- Tránh cọ xát làm các bóng nước bị vỡ.
- Nếu phát hiện thấy trẻ có dấu hiệu bệnh tiến triển nặng phải chuyênn trê đến bệnh viện để điều trị kịp thời tránh biến chứng sảy ra.

b) Phòng bệnh


Bệnh Thủy đậu đã có vắc xin phòng bệnh. Vậy nên tiêm chủng là cách phòng bệnh thủy đậu tốt nhất.

Bệnh thủy đậu tuy nhẹ nhưng chúng ta phải chăm sóc, điều trị tốt để đề phòng biến chứng do bệnh thủy đậu gây ra như nhiễm trùng nốt phỏng, viêm phổi, viêm màng não ...



c) Biện pháp chống dịch

- Cách ly trẻ mắc thủy đậu ở nhà trong 10 ngày. Trẻ tiếp xúc với người bị thủy đậu cần cách ly 11 – 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Người lớn mắc bệnh không được di làm, tránh tiếp xúc với người khác.
- Vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng ;
- Đeo khẩu trang cho người bệnh và người lành khi tiếp xúc;
- Sát khuẩn tay uế đồ vật bị nhiễm dịch tiết từ mũi họng.
- Tuyên truyền cho các giáo viên về công tác phòng bệnh Thủy đậu



Trên đây là bài tuyên truyền về cách nhận biết, phòng và chống bệnh Thủy đậu gửi đến cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trường MN Tràng An.



Đỗ Thị Chính

Nhân viên Y tế

Nguyễn Thị Anh